SUR QUELQUES HEMIPTERES AQUATIQUES DE L'AFRIQUE ORIENTALE ET DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES

par Raymond POISSON (Rennes)

Famille HEBRIDAE

1. **Hebrus (Hebrus) alluaudi** Poisson 1944.

Syn. : *Hebrus alluaudi* Poisson, *Rev. Fr. d'Entom.*, vol. X, p. 103, fig.

Distr. : décrit de l'Afrique orientale anglaise (Nairobi); Ethiopie : Addis-Abeba, leg. S. Patrizi (Coll. Mancini e Patrizi), la fig. 1 représente une paramère mâle.

2. **Hebrus (Hebrus) mancinii** n. sp. (fig. 2).

Vertex et pronotum violacés; bord collaire du pronotum renflé en bourrelet, de couleur roux jaunâtre, ainsi que son extrême marge postérieure scutellaire. De courts poils dorés sur les nervures et la zone coriacée des hémélytres.

Scutellum d'un noir violacé; sa pointe roux jaunâtre. Angles huméraux du pronotum roux. Face ventrale noire.

Vertex finement canaliculé au milieu longitudinalement, le sillon étant très rétréci au niveau des ocelles (fig. 2). Buccules en forme de lames régulières (fig. 3, B). Scutellum légèrement échancré à sa pointe (fig. 2 et 4 A). Disque du pronotum ponctué comme il est indiqué (fig. 2).

Antenne: 1er article 1,6 fois plus long que le second; les autres mutilés.

Patte postérieure: fémur et tibia sensiblement droits, non contournés; F = 59; T = 69; t = 19,5.

Paramères: la figure 4, B, C, les représentent sous deux aspects différents, la figure 4, C étant un peu plus grossie que la fig. 4, B.

Long. : 2,8 mm.

Distr. : 1 mâle macroptère; Addis-Abeba, leg. S. Patrizi (Coll Mancini).

Fig. 1. - *Hebrus alluaudi* Poiss.; un paramère.



Fig. 3. - *Hebrus mancinii;* tête vue latéralement; B, buccule droite; R, rostre.



Fig. 2. - *Hebrus* (*Hebrus*) *mancinii* n. sp.; vue partielle dorsale d'un mâle.



Fig. 4. - *Hebrus mancinii*: A, scutellum; B, C, paramères.

Famille GERRIDAE

3. **Eurymetropsiella congoensis** n. sp. (fig. 5).

Forme aptère : pigmentation assez comparable, dans l'ensemble, à celle d'*Eurymetropsiella schoutedeni* Poiss. (R. Poisson 1950 p. 73, fig. 6 in *Rev. Zool. Bot. Afr.* vol. XLIII, fasc. 1-2) et consistant en taches flaves distribuées sur un fond noir luisant (fig. 5). Vertex avec 2 taches flaves antérieures disposées en V inversé et une bande transversale flave sur le bord postérieur. Bord postérieur du pronotum jaunâtre, la bande étant continue chez les femelles et interrompue au milieu chez les mâles; les autres taches disposées comme l'indique la fig. 5. Corps plus allongé que chez *E. schoutedeni*, près de 2 fois plus long que large.

Antenne: dernier article incurvé en S très ouvert; 1er article renflé à la base (fig. 6, A): 80 - 69 - (4) - 45 - (2) - 31.

Patte antérieure: F=91; T=80; t=13+36.

La base du fémur est flave; le tibia est finement denticulé ventralement et son éperon tarsien est assez accentué (fig. 6, B).

8ème segment tubuleux.

Capsule génitale non bifurquée à l'extrémité, laquelle est modérément acuminée. Les paramères son légèrement incurvés, plutôt lamelleux et non aciculés comme chez *E. schoutedeni* (fig. 6, C).

Long. : mâle aptère, 4,6 mm; femelle aptère, 4,5 mm; largueur maximum, 2,3 mm.

Distr. : Congo (Brazzaville); 1 mâle et 1 femelle aptères (ma coll.).

4. **Tenagogonus (Tenagogonus) longicornis** Poisson 1949.

Syn. *Tenagogonus longicornis* Poisson, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1949, p. 133 et *Mém. I.F.A.N.*, n. 19, 1952, p. 281, fig. 5, 6, 7.

Tenagogonus longicornis forme **mediocornis** nov. var.

Forme aptère mâle : même pigmentation générale que le type (fig. 7).

Antenne: article I, légèrement épaissi, incurvé à la base et atteignant une longueur de 8 mm; article III, 6,5 mm; article IV, mutilé. Les antennes sont proportionnellement plus courtes que chez le type.

Angles postérieurs du 7ème segment abdominal aigus, mais proportionellement moins longs que chez *T. longicornis longicornis* et



Fig. 5. - *Eurymetropsiella congoensis* n. sp.; femelle (bande jaunâtre du bord postérieur du pronotum en réalité non interrompue au milieu).



Fig. 7. - *Tenagogonus longicornis mediocornis* nov. var.: région antérieure, A et abdomen, B, vus dorsalement.



Fig. 6. - *Eurymetropsiella congoensis* (mâle): A. antenne; B, patte antérieure; C, un paramère.

ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen, ainsi que chez les femelles (fig. 7, B).

Squelette des pièces péniales comme chez le type.

Long. : 14 mm.

Distr. : mâle aptère du Congo Français; 2 mâles aptères du Cameroun, Bitye (G. L. Bates 1910) (British Museum).

Famille VELIIDAE

5. **Microvelia (M.) negusi** n. sp.

Vertex noir. Yeux roux noirâtre. Antennes noires. Bord collaire du pronotum avec une étroite bande orangée n'atteignant pas tout à fait les marges latérales; le reste noirâtre et ponctué d'une manière vaguement transversale; une faible carène médiane antérieure. Hémélytre d'un brunâtre terne, les nervures plus claires, avec des taches pâles, non blanches, mal délimitées, distribuées comme l'indique la figure 8, D. Face ventrale noire; latérotergites jaunâtres, ainsi que les pattes qui sont toutefois noirâtres au niveau des articulations fémorotibiales.

Antenne: (femelle macroptère): 1er article assez épais, quelque peu incurvé; sa 1ère moitié flavescente, nettement plus courte que l'article IV; article II: 12,5; article III: 18,5; article IV: 26.

Patte antérieure (mâle): F = 80: T = 79; t = 36 (fig. 8, A, B).

Peigne tibial implanté sur un éperon convexe et court (fig. 8, A et C).

Huitième segment abdominal (fig. 8, E). Paramères en languette (fig. 8, F).

Long.: 2,8 à 2,9 (macroptères); largeur 1 à 1,2 mm; 1 femelle aptère mesure 3 mm.

Distr.: Ethiopie: Galla Lieca, leg. S. Patrizi (Coll. Mancini e Patrizi).

6. **Microvelia (M.) arussii** n. sp.

Vertex noir. Yeux rouge vineux. Bord collaire du pronotum orange, le reste du disque noir finement ponctué, les points bordant la bande collaire plus accentués. Extrémité du pronotum arrondie, progressivement rétrécie. Pattes plutôt grêles et allongées. Hémélytres brunâtres avec des taches blanches distribuées comme le représente la fig. 9, C.

Bord tergal du connexivum roussâtre; sa marge sternale roux orange, ainsi que les marges latéro-ventrales du pronotum; le reste de la face ventrale noire. Pattes et antennes plus ou moins roux noirâtre.

Antenne: 11 - 12 - 15,5 - 21,5.



Fig. 8. - *Microvelia negusi* n. sp. (mâle): A, B, C, patte antérieure; D, hémélytre gauche; E huitième segment abdominal; F, un paramère.

Patte antérieure: fémur 1,12 fois plus long que le tibia, lequel est 1,75 fois plus long que le tarse. Peigne tibial 5 fois plus court que le tibia (fig. 9, A, B).

Patte intermédiaire: F = 32; T = 35; t = 10 + 12,5.

Patte postérieure: F = 40; T = 49; t = 11 + 13.

Huitième segment abdominal cylindrique (fig. 9, D).

Paramères en languettes un peu arquées (fig. 9, E, F, G).

Long. : 2,8 mm (macroptère).

Distr. : Ethiopie; ♂♂, ♀♀, Arussi occidental, leg. S. Patrizi (Coll. Mancini e Patrizi); Gondar, leg. Dainelli (Musée de Gênes).

Rem. : l'espèce est voisine de *M. venustissima* Poiss. et de *M. kijabiensis* Poiss.



Fig. 9. - *Microvelia arussii* n. sp. (mâle): A, B, patte antérieure; C, hémélytre gauche; D, huitième segment abdominal; E, F, G, paramères sous des aspects différents.

7. **Rhagovelia mancinii** n. sp.

Forme aptère : aspect plutôt trapu; 2,7 fois plus long que large (femelle). Yeux noirs; tête en grande partie rousse, avec une courte bande noire longitudinale, de part et d'autre, sur le vertex antérieur.

Pronotum noir, y compris son bord collaire, lequel est bordé postérieurement par une bande jaune flave qui s'élargit de part et d'autre. Régions latérales du mésonotum jaunes; métanotum en grande partie noirâtre, ainsi que les autres tergites abdominaux. Latéro-tergites avec una large bande jaune longitudinale. Tranche du connexivum noire.



Fig. 10. - *Rhagovelia mancinii* n. sp. (mâle): A patte postérieure gauche; B, C, paramères.

Une tache jaune roux luisante sur le milieu des tergites 4 à 7, particulièrement étendue sur les segments 6 et 7.

Pattes et antennes jaune noirâtre. Face ventrale en grande partie jaune roux, les latéro-sternites jaunes, les flancs stigmatiques noirâtres. Pilosité peu dense.

Mâle aptère: pigmentation générale un peu plus obscure, les taches des tergites 4 à 7 moins nettes.

Macroptères: coloration identique; hémélytres noir grisâtre, les nervures noires; sternites abdominaux uniformément roux jaunâtre. Bande jaune flave du pronotum antérieur scindée en 2 fossettes flaves, droite et gauche, et séparées par un interval noir grisâtre présentant une fine carène médio-longitudinale, noir sépia.

Antenne (femelle aptère): 25 - 17,5 - 19 - 17.

Patte postérieure (mâle aptère): fémur et tibia subégaux armés de dents comme le montre la figure 10, A, 2,6 fois plus grand que le tarse; 1er article du tarse 3,6 fois plus court que le second, lequel est 1,5 fois plus court que le 3ème.

Fémur assez fortement renflé, noir luisant, teinté de jaune à son extrémité coxale.

Paramères arqués et lamelleux (fig. 10, B, C).

Long.: femelle aptère, 5,3 mm à 5,5 mm; mâle aptère, 4,9 mm. Mâle et femelle macroptères, 6,1 à 6,2 mm.

Distr.: Ethiopie; ♂♂, ♀♀, Gondar (f. Maona), leg. G. Dainelli (Mus. de Gênes).

Famille NEPIDAE

8. **Laccotrephes dissimulatus dissimulatus** Montandon 1912.

Syn.: *Laccotrephes dissimulatus* Montandon, *Bull. Soc. Roum. Sc. Bucarest*, vol. XX, n. 6, 1912, p. 648.

Cette Nèpe se caractérise par le pronotum legérement rétréci, atténué, vers l'avant, ses côtés latéraux subparallèles sur leur tiers antérieur .Vertex caréné médianement, cette caréne étant interrompue par un étroit sillon transversal, un peu en arrière du bord antériour des yeux.

L'abdomen est quelque peu dilaté en arrière du milieu. Les tergites abdominaux sont noirs. Le scutellum présente une carène simulant une fourche bidentée à manche postérieur (fig. 12, C).

Patte antérieure: fémur un peu plus long que le pronotum, vu latéralement, peu dilaté,présentant une seule dent arrondie inféro-interne vers la base et assez peu développée (fig. 12, B). Pronotum non invaginé c'est à dire non ensellé, à carène le plus souvent droite, parfois quelque peu bombée; le tubercule antérieur faiblement indiqué; le postérieur estompé, la carène médiane s'élevant sensiblement à son extrémité mésothoracique.

Fig. 11. - *Laccotrephes dissimulatus dissimulatus* Mont. extrémité apicale d'un paramère.



Fig. 12. - *Laccotrephes dissimulatus incisus* Mont. (mâle) (Montandon dét.): A. antenne; B, dent fémorale d'une patte antérieure; C, scutellum; D, E, paramères E, région apicale plus grossie.

Paramères des mâles présentant une forte dent dans la gorge sous le crochet terminal (fig. 11).

Long.: 30 à 32 mm, parfois 35 mm; appendices siphonaux, 26,5 à 28 mm, assez robustes.

Distr.: Congo Belge, Transvaal, Cameroun, Afrique orientale, Afrique du Sud, etc.

9. **Laccotrephes dissimulatus incisus** Montandon 1912.

Syn.: *Laccotrephes dissimulatus incisus* Montandon, *Bull. Soc. Roum. Sc. Bucarest*, vol. XX, n. 6, 1912. p. 649.

Cette sous-espèce se distingue du type par sa taille un peu plus forte, 35 à 36 mm. Les *L. dissimulatus* congolais ont des fémurs antérieurs mesurant 11,5 à 11,6 mm (long.: 31,5 mm); les *L. d. incisus*, des fémurs antérieurs atteignent 13,5 mm chez un mâle mesurant 35 mm. Les autres caractères de *L. d. incisus* sont sensiblement les mêmes que ceux de la forme type, mais le pronotum est moins rétréci vers l'avant; les pattes sont un peu plus longues; les fémurs postérieurs rabattus dépassent légèrement la dernière suture abdominale. La carène prosternale est plutôt légèrement concave et se montre, chez certains individus, coupée transversalement, vers son milieu, par 2 scissures, non toujours bien nettes. Les fémurs sont cerclés d'un anneau flave au delà du milieu. Les antennes offrent une morphologie semblable à celles de *L. d. dissimulatus* (fig. 12, A) (R. Poisson, 1949, p. 31, fig. 34, A: *Inst. des Parcs Nat. du Congo Belge* fasc. 58), mais les paramères présentent une dent apicale plus courte et proportionnellement plus large que chez le type ainsi que la pointe du crochet plus arrondie (fig. 12, D, E).

Rem.: *L. dissimulatus* appartient apparemment au groupe *L. brachialis*, mais s'en distingue par ses fémurs antérieurs moins robustes, ses appendices siphonaux proportionnellement plus courts; les paramères des mâles pourvus d'une dent pré-apicale sous le crochet, mais la carène prosternale est du même type.

Le groupe *L. brachialis* comprend actuellement:

L. brachialis brachialis Gerst. 1873.
L. brachialis oculatus Montandon 1898
L. brachialis kazibae Poisson 1954
L. dissimulatus dissimulatus Montandon 1912
L. dissimulatus incisus Montandon 1912.

Famille RANATRIDAE

10. **Ranatra congoensis congoensis** Poisson 1949.

Syn. *Ranatra congoensis* Poisson, *Inst. Parcs Nat. Congo Belge*, facs. 58, 1949, p. 42.

Cette espèce, dont les plus grands exemplaires congolais mesurent 48,5 mm (femelle) avec des appendices siphonaux de 57 mm, présente une variété de taille plus faible (31 à 35 mm): *R. congoensis mabwei* Poiss., de l'Upemba et j'en ai examiné des exemplaires de taille encore plus petite (27 à 28 mm) avec des appendices de 30 mm en provenance de l'Ouganda (Ph. Corbet 1954), dont les caractères morphologiques des antennes, des fémurs antérieurs unidentés et à forte encoche prètibiale, sont très comparables aux caractères spécifiques des *R. congoensis* de grande taille (f. **corbeti** nov. var.).

Famille APHELOCHEIRIDAE

11. **Aphelocheirus corbeti** n. sp.

Mâle brachyptère: pigmentation jaune paille. Yeux marron foncé. Bord collaire interoculaire du pronotum brun noirâtre, son bord postérieur juxta-scutellaire noirâtre. Ecailles hémélytrales légèrement obscurcies (fig. 13). Synthlipsis 1,6 fois plus étroit que la largeur du vertex au niveau du bord antérieur des yeux et 2 fois plus large environ que la largeur d'un oeil. Tête 1,55 fois plus longue que large au niveau du synthlipsis.

Pronotum 4,25 fois plus large à la base que long au milieu. Ecaille hémélytrale 1,6 fois environ plus large que longue. L'insecte lui-même est 1,7 fois plus long que large (fig. 13).

Antenne: dernier article près de 2 fois aussi long que le pénultième et 2,33 fois plus long que l'antépénultième (fig. 14, A).

Patte antérieure: F = 37; T = 34; t = 19+11.

Paramères dissymétriques, le droit (fig. 14, C) un peu acuminé à l'extrémité; le gauche à extrémité arrondie (fig. 14, B). Processus spinuleux du 9ème segment écailleux aux extrémités qui sont spatulées (fig. 14, D, gauche; E, droit).

Long.: 9,5 mm; largeur, 5,5 mm.

Distr.: 1 mâle brachyptère, lac Albert, plage près du lac Buhuka (Ph. S. Corbet, 23-III-1954).

Rem. : Les *Aphelocheirus* africains et malgaches sont peu connus, ces Insectes benthiques étant rarement capturés. Les espèces suivantes ont été décrites :



Fig. 13. - *Aphelocheirus corbeti* n. sp.; mâle brachyptere.



Fig. 14. - *Aphelocheirus corbeti* (mâle): A, antenne; B, C, paramères; D, E, styloides.

1) *Aphelocheirus debilis* Kiritschenko 1924-25 (*Russ. Hydr. Zeitsch.*, vol. IV, n. 1-2, p. 39). Cette forme existerait aussi à Madagascar (R. Poisson 1951, *Mém. Inst. Sc. Madag.*, sér. A, vol. V, fasc. I, p. 110, fig. 36, A, B). Peut-être correspond-elle à la forme macroptère de *A. schoutedeni* Montandon.

2) *Aphelocheirus schoutedeni* Montandon 1914 (*Rev. Zool. Bot. afr.*, vol. IV, 1914, p. 177): 1 mâle brachyptère de 7,5 mm x 5 mm, du Congo Belge.

3) *Aphelocheirus rotroui* Bergevin 1925 (*Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, vol. 16, 1925, p. 80): 1 mâle macroptère capturé à Taza (Maroc), de 10 mm x 6,5 mm.

4) *Aphelocheirus lugubris* Horvath 1899 (*Term. Füzet.*, vol. 22, 1899, p. 266 et Poisson, *Mém. Inst. Sc. Madag.*, sér. E, vol. I, fasc. I, 1952, p. 63); long.: 7,75 mm x 4,75 mm; Madagascar (1).

Famille NOTONECTIDAE

12. **Anisops pseudotuberculata** n. sp.

Pigmentation: 2 traits bruns parallèles sur le vertex antérieur, brusquement divergeants à leur extrémité clypéale où ils simulent 2 guillemets, noirs très nets et mieux accentués que chez *A. tuberculata* Poiss. Yeux gris ardoisé chez la femelle, noirs chez le mâle. Pronotum translucide. Scutellum noir, ou noirâtre en avant, flave vers la pointe. Hémélytres hyalins, leur marge scutellaire pouvant être carminée. Tergites abdominaux en grande partie noirâtre. Pattes jaunâtres; bord médian antérieur du pronotum non tuberculé chez le mâle. Eperon rostral accentué (fig. 15). Pattes antérieure: F = 75; T = 88; t = 51. Le peigne tibial est composè d'une dizaine de dents dont les 2 premières sont les plus grandes, précédées elles-mêmes de 2 mucrons odontoides (fig. 15, A). Le tibia porte 7 à 8 fortes soies latéro-externes et 2 épines à son extrémité tarsienne; une autre épine s'observe à l'extrémité tibio-ventrale du tarse. Synthlipsis 2,4 fois plus étroit que la plus grande largeur du vertex antérieur.

Long.: 6,3 mm (mâle); 7,2 mm (femelle).

Rem.: Cette espèce est un peu plus grande qu'*A. tuberculata* Poiss.

Distr.: Erythrée, Hamasien, leg. G. Müller (Coll. Mancini e Musée de Trieste).

---

(1) A ma connaissance les autres espèces d'*Aphelocheirus* actuellement décrites sont les suivantes:

A. aestivalis (Fab.) 1794 (=*montandoni* Horv. 1899; *kervillei* Kuhlg. 1898): Europe moyenne et du Sud. *A. breviceps* Horvath 1895: Caucase, Transcaucasie. *A. plumipes* Oshanin 1909 (= *turanicus* Montandon 1911): Turkestan. *A. denticeps* Montandon 1910: Chine moyenne. *A. sinensis* Montandon 1892: Chine moyenne. *A. nawae* Matsumura 1905: Japon. *A. vittatus* Mats. 1903: Japon. *A. kawamurae* Mats. 1915: Japon. *A. shirakii* Mats. 1905: Japon. *A. amurensis* Kiritshenko 1924: Amur. *A. kolenati* Kiritsh. 1924 (*nigrita* Kiritsh. 1918 non Horvath 1899): Transcaucasie. *A. variegatus* Kiritsh. 1924: Sibérie. *A. bianchii* Kiritsh. 1933: Turkestan. *A. improcerus* Kiritsh. 1929: Amur. *A. carinatus* Royer 1920: Indo-Chine (Hanoi). *A. gularis* Horvath 1918: Annam. *A. inops* Horvath 1918: Annam. *A. nigrita* Horvath 1899 (=? f. macropt. d'*A. aestivalis* Fab.) (Montandon 1911): Hongrie. *A. pallens* Horvath 1899: Nouvelle Guinée. *A. ussuriensis* Kiritshenko 1929: Sibérie austro-orientale. *A. takeuchii* Esaki 1934: Japon (Honshu). *A. uichancoi* Usinger 1937: I. Philippines. *A. philippinensis* Usinger 1937: id. *A. australicus* Usinger 1937: Queensland du Nord (voisin de *A. pallens* Horv.)

N. B. A. *shirakii* Mats. est apparemment synonyme de *A. vittatus* Mats.

13. **Anisops pugnax** Poisson 1945.

Syn.: *Anisops pugnax* Poisson, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1945, p. 94, fig. 8.

L'espèce se présente sous 2 formes: une forme pigmentée, mélanisante, *A. pugnax pugnax* et une forme pâle, *A. pugnax dorfui* nov. var.



Fig. 15. - *Anisops pseudotuberculata* n. sp. (mâle) A, peigne tibial et ses soies annexes; B, une patte antérieure gauche; C, 3ème article rostral et son éperon.

Anisops pugnax pugnax: vertex, pronotum, pattes, jaunâtres. Scutellum noir; ses marges parfois oranges. Marge scutellaire des hémélytres et de la fossettes hémélytrales rouge carmin. Metanotum et derniers tergites abdominaux noirs; les autres jaunâtres. Sternites abdominaux noirs.

Mâle: tibia antérieur 1,2 à 1,3 fois plus long que le tarse Fémurs antérieur à extrémité tibiale arrondie, non anguleuse comme chez *A. decipiens* Hutch. (fig. 16, C) (cf. G. T. Brooks, *Un. Kans. Sc. Bull.*,



Fig. 16. - *Anisops pugnax pugnax*: (mâle) A., tête et pronotum; B, 3ème et 4eme articles rostraux; le 3ème avec son éperon droit; C, schéma du fémur et du tibia antérieur (mutilé chez le mâle examiné).



Fig. 17. - *Anisops pugnax dorfui* nov. var. (mâle): A. 3ème et 4ème articles rostraux; B, patte antérieure; C, peigne tibial et ses soies annexes.

vol. XXXIV, n. 8, pl. XLVIII, fig. 62, 1951, p. 401) ou *A. gobana* Poiss. - Plectrum tibial de 10 à 12 dents assez régulières et de taille croissante. Synthlipsis 1,7 (femelle du Kenya) à 2 fois plus étroit que la largeur du vertex. Chaque éperon rostral plus long que le 3ème article (fig. 16, B).

Long. : 7,5 mm. à 8,2 mm.

Distr. : Kenya, 2.000 m (Alluaud).

Anisops pugnax f. **dorfui** nov. var.

Face dorsale d'un flave jaune paille; yeux brun chocolat; sternites abdominaux noirs, la carène médiane jaune. Les dents du peigne tibial sont, semble-t-il, plus longues que chez le type et de grandeur croissante (fig. 17, B et C).

Long. : 8,5 mm (mâle); 8,75 mm (femelle).

Distr. : Erythrée, Dorfu 1939, leg. F. Vaccaro (Coll. Mancini). Ethiopie, Addis-Abeba, leg. S. Patrizi (Coll. Patrizi).

Rem. : *Anisops pugnax* Poiss. est proche d'*A. varia* Fieber et surtout d'*A. decipiens* Hutch. et *gobana* Poiss.

Fig. 18. - *Micronecta dimidiata mancinii* nov. var. (mâle): A, lobe tergal du 8ème segment abdominal; B, C, paramères, B (droit), C, (gauche).

14. **Micronecta dimidiata** Poisson 1928.

Syn. : *Micronecta dimidiata* Poisson, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, n. 4, p. 73; *Faune des col. françaises*, vol. III, 1929, p. 156, fig.
Micronecta piccanin Hutchinson, *Ann. South Afr. Mus.*, vol. XXV, part 3.

Micronecta dimidiata f. **mancinii** nov. var. : hémélytres de teinte uniformeménent brunâtre; taille plus forte que celle d'exemplaires de l'Afrique du Sud ou du Cameroun; les formes brachyptères mesurent 2,4 mm au-lieu de 1,7 mm et les macroptères, 2,5 mm au-lieu de 2,2 mm. Le lobe tergal du 8ème segment abdominal des mâles offre une morphologie quelque peu différente (fig. 17, A), mais les paramères sont de même conformation (fig. 18, B. C).

Distr. : Ethiopie, Addis-Abeba, leg. S. Patrizi (Coll. Mancini et Patrizi).